

Tájékoztató dTap védőoltás esedékességéről és felhívás az oltóhelyen történő megjelenésre
(A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló többszörösen módosított 18/1998. (VI. 3.) NM 5. § és 15. § alapján)

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Értesítem, hogy nevű gyermeke,
Születési ideje: TAJ száma:
dTap (diphtheria – tetanus - pertussis elleni) védőoltásra kötelezett.

Az oltásra a gyermek az oltási könyvét hozza magával!

Tetanusz-oltásban részesített gyermek a dTap védőoltást csak 6 hónap után kaphatja meg.

Amennyiben gyermeke tetanusz oltást kapott, kérem, írja le az oltás időpontját:

Ha a gyermek bármilyen okból a fenti címen és időpontban nem tud megjelenni, akkor szíveskedjék értesíteni, illetve ha a gyermek a védőoltást már megkapta, vagy a védőoltás alól végleges mentességet kapott, akkor ezt igazolja.

Tájékoztatom arról is, hogy amennyiben a gyermek kötelező védőoltása, megalapozott orvosi indok nélkül – többszöri értesítés ellenére – elmarad, akkor az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes kistérségi/fővárosi kerületi intézete a védőoltás beadását határozattal rendeli el.

Védőoltással kapcsolatos információk:

A dTap védőoltás Diftéria, tetanusz és acelluláris pertussis komponenst tartalmazó oltóanyaggal végzendő emlékeztető oltás. Ez a védőoltás **3 súlyos betegség**: a **torokgyík** (Diftéria, **D**), a **merevgörcs** (Tetanusz, **T**), a **szamárköhögés** (Pertussis, **Pa**) megbetegedésekkel szemben biztosít védelmet.

A **torokgyík** baktérium okozta fertőzőbetegség. A kórokozó főleg a légutakat, néha a bőrt támadja meg. A torokban, rendszerint a mandulákon, ritkán a gégeben, vagy más nyálkahártyákon, esetleg a bőrön tapad meg és vaskos szürkés lepedéket hoz létre. Súlyos légzési nehézséget és esetenként fulladást okoz. A baktérium toxint (mérget) is termel, ami idegrendszeri károsodást, szívbetegséget, sőt még halált is okozhat.

A **merevgörcs** igen súlyos, magas halálozással járó betegség. A kórokozó földdel szennyezett seben keresztül jut be a szervezetbe és ott toxint (mérget) termel. A toxin súlyos idegméreg, amely hatására az izmok görcsös állapotba kerülnek.

A **szamárköhögés** kínzó köhögéssel, húzó, hangos belégzéssel járó, több hétig tartó bakteriális betegség, mely a légúti váladékcspepekkel terjed. Az anyától származó védelem bizonytalan, ezért az egészen fiatal csecsemők

is megbetegedhetnek. Az utóbbiak közt van a legtöbb haláleset a légúti és az idegrendszeri szövődmények következtében.

Az évtizedek óta rendszeresen végzett oltások következtében ez a 3 betegség hazánkban mára szinte teljesen eltűnt. De a környezetünkben a kórokozók jelenlétével továbbra is számolnunk kell. Ezek az oltott személyekben is megtelepedhetnek, megbetegedést viszont csak az oltatlanok illetve a hiányosan oltottak körében okozhatnak.

Az oltás helyén fellépő bőrpír, duzzanat beavatkozás nélkül megszűnik. Jelentkezhet láz, hányás, hasmenés, nyugtalanság.

A lázas állapot gondos megfigyelést és folyamatos lázcsillapítást igényel.

A védőoltást követő reakciókról tájékoztassa a gyermek oltását végző orvost!