

## Tájékoztató Hepatitis B védőoltás esedékességéről

(A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésről szóló többszörösen módosított 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 5. és 15. §. alapján)

### Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Értesítem, hogy .....nevű gyermeke,  
születési helye és ideje:.....  
tartózkodási címe:.....

### Hepatitis B védőoltásra kötelezett.

Az oltás helye:.....

Az oltás időpontja:.....

Oltóorvos:.....

Kérem, szíveskedjék gyermeke **Oltási könyvét és a tájékoztatásról szóló igazoló szelvényt** az iskola-védőnőhöz eljuttatni!

Ha bármilyen okból a fenti időpontban a gyermeke nem tud megjelenni az oktatási intézményben, illetve ha a gyermeke a védőoltást már megkapta, vagy a védőoltás alól végleges mentességet kapott, akkor ezt kérjük igazolni.

Tájékoztatom, hogy amennyiben gyermeke kötelező védőoltása, megalapozott orvosi indok nélkül, többszöri értesítés ellenére elmarad, akkor az ÁNTSZ illetékes kistérségi intézete a védőoltás beadását határozattal rendeli el.

Fontos, hogy még az oltás előtt tájékozott legyen! A védőoltással kapcsolatos fontosabb tudnivalók:

✂.....✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂

Aláírással igazolom, hogy a Hepatitis B védőoltásról szóló tájékoztatást, valamint az oltóhelyen való megjelenésről szóló értesítést megkaptam és átvettem:

Dátum:.....

.....  
Szülő aláírása

A vírusfertőzések közül – a Hepatitis B – okozta megbetegedések megelőzése céljából Magyarországon, a 2009/2001. tanévben az általános iskolák 7. és 8. osztályát végző gyermek, illetve az adott évi Védőoltási Módszertani Levélben meghatározott korcsoportú gyermek Hepatitis B elleni védőoltásra kötelezett. A védettség kialakulásához 2 oltásra van szükség. A második oltás az első oltást követően 6 hónap múlva esedékes.

Hepatitis B vírus (HBV) vérrel, szövetnedvekkkel, váladékokkal (ondó, hüvelyváladék, nyál) parenterálisan terjed. Ez határozza meg az elsődleges terjedési módokat: szexuális út, vér, vérvérvétel, vérvétel, szövetnedvekkkel, váladékokkal szennyezett orvosi eszközök, műszerek alkalmazása, szerv-, szövetátültetés kapcsán, intravénás kábítószer-élvezők közös tű-fecskendő használata esetén.

*Lappangási idő:* 45–180 nap, leggyakrabban 60–90 nap.

*Fontosabb tünetek:* Lassan kezdődik, rendszerint láz nélkül. A betegnél fáradtság, ízületi fájdalmak, étvágytalanság jelentkezik, majd ezt követően a sárgaság. A fertőzés krónikussá válhat. A krónikus fertőzés kialakulásának kockázata annál nagyobb, minél korábbi életkorban következik be a fertőződés. Késői következménye a májcirrhosis és a májrák.

Az oltás helyén fellépő bőrpír duzzanat beavatkozás nélkül megszűnik. Jelentkezhet láz, hányás, hasmenés, nyugtalanság. **A lázas állapot gondos megfigyelést és folyamatos lázcsillapítást igényel. A tünetek tartós fennállása esetén haladéktalanul jelentkezni kell az oltóorvosnál!**

Dátum:.....

.....  
PH.

.....  
Iskola-védőnő

Iskola-védőnői szolgálat neve: .....

címe: .....

telefonszáma: .....