

Tájékoztató MMR védőoltás esedékességéről és felhívás az oltóhelyen történő megjelenésre
(A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló többszörösen módosított 18/1998. (VI. 3.) NM 5. § és 15. § alapján)

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Értesítem, hogy nevű gyermeke,

Születési ideje: TAJ száma:

MMR (morbilli-mumpsz-ruberola elleni) védőoltásra kötelezett.

Az oltásra a gyermek az oltási könyvét hozza magával!

1 hónapon belül kapott-e oltást a gyermek? NEM IGEN :

..... oltást

Van-e a gyermeknek nagyfokú tojásérzékenysége? NEM IGEN

Ha a gyermek bármilyen okból a fenti címen és időpontban nem tud megjelenni, akkor szíveskedjék értesíteni, illetve ha a gyermek a védőoltást már megkapta, vagy a védőoltás alól végleges mentességet kapott, akkor ezt igazolja.

Tájékoztatom arról is, hogy amennyiben a gyermek kötelező védőoltása, megalapozott orvosi indok nélkül – többszöri értesítés ellenére – elmarad, akkor az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes kistérségi/fővárosi kerületi intézete a védőoltás beadását határozattal rendeli el.

Védőoltással kapcsolatos információk:

A vírusok okozta cseppfertőzéssel terjedő fertőző gyermekbetegségek közül – a **kanyaró, a mumpsz, a rózsahimlő** – megbetegedések megelőzése céljából Magyarországon minden egészséges 15 hónapos gyermek MMR védőoltásra kötelezett. Az oltást 11 éves (6. osztályos) korban meg kell ismételni.

A **kanyaró** (morbilli, **M**) 9-10 napos lappangási idő után lázzal, köhögéssel, huruttal és kötőhártya-gyulladással kezdődik, majd pár nap múlva a fül mögött kezdődő és az egész testen végigvonuló kiütések lépnek fel. Súlyos betegség, mely könnyen átvihető egyik emberről a másikra.

A **járványos fültőmirigy gyulladás** (mumpsz, **M**) 2-3 hét lappangási idő után lázzal és az egyik, majd a másik oldali nyálmirigy duzzanatával jár. Fiúknál a betegség szövődményeként jelentkező heregyulladás súlyos következményekkel járhat.

A **rózsahimlő** (rubeola, **R**) lappangási ideje 2-3 hét. Gyermekeknél enyhe formában zajlik, láz, apró kiütések, tarkótáji nyirokcsomó duzzanat formájában. A terhesség első harmadában átvészelt fertőzés következménye lehet az ún. veleszületett rubeola (fejlődési rendellenességekben jelentkeznek).

A több évtizede alkalmazott oltási stratégiának köszönhetően az utóbbi években hazai eredetű kanyaró megbetegedés nem fordult elő, a rózsahimlő és mumpsz megbetegedések évi száma napjainkra 50-100 alá csökkent.

Az oltóanyag, élő gyengített kanyaró, rózsahimlő és mumpsz vírusokat tartalmaz. A természetes fertőzéshez hasonló módon hat a védekező-rendszerre. Általában az 5-12. nap között ún. oltási betegség léphet fel lázzal, kiütéssel, esetleg nyálmirigy duzzanattal. A tünetek sokkal enyhébbek, mint a természetes betegségnél észleltek és nem tartanak 1-2 napnál tovább.

A lázas állapot gondos megfigyelést és folyamatos lázcsillapítást igényel.

A védőoltást követő reakciókról tájékoztassa a gyermek oltását végző orvost!